

BS-53	30102873	Soporte de acrílico para bolsa de sangre	UN	Centro de Hemoterapia tipo I/II	PRESENTACIÓN: Soporte individual en empaque por 100 ó más unidades. CARACTERÍSTICAS: Soporte individual de acrílico incoloro, de base cuadrada con ranura para colocar la bolsa de sangre en posición vertical. USO: Almacenamiento de bolsas de sangre.
BS-54	30105159	Suero anti A	CM3	I-III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti A, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales. Título de 256 dils. y avidéz de 8 a 12 segundos (como mínimo). USO: Determinación del Grupo Sanguíneo A en lámina o en tubo.
BS-55	30105162	Suero anti B	CM3	I-III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti B, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales. Título de 256 dils. y avidéz de 8 a 12 segundos (como mínimo). USO: Determinación del grupo sanguíneo B en lámina o en tubo.
BS-56	30105460	Suero anti C (Mayúscula)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti C (mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo C (Mayúscula) en lámina o en tubo.
BS-57	30105462	Suero anti c (Minúscula)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti c (minúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales. USO: Determinación del Fenotipo c (Minúscula) en lámina o en tubo.
BS-58	30104297	Suero anti C ^w	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti C ^w , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo C ^w en lámina o en tubo.
BS-59	30106006	Suero anti C3d-C3b	CM3	Centro de Hemoterapia tipo I / II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti C3d-C3b, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales. USO: Prueba de Antiglobulina Humana, anticomplemento en tubo.
BS-60	30104298	Suero anti Co ^a	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Co ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Co ^a en lámina o en tubo.
BS-61	30106007	Suero anti Co ^b	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Co ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Co ^b en lámina o en tubo.



000070