

BS-71	30106009	Suero anti I (Mayúscula)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti I (Mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo I (Mayúscula) en lámina o en tubo.
BS-72	30105176	Suero anti IgG anti C3d Poliespecifico (AGH)	CM3	Centro de Hemoterapia I/II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti IgG anti C3d poliespecifico, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales y/o policlonales. USO: Prueba de AGH Poliespecifico en tubo.
BS-73	30104307	Suero anti IgG mono específico	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti IgG mono específico, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales. USO: Prueba de AGH Mono específico anti IgG en tubo.
BS-74	30104314	Suero anti Jk ^a	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Jk ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Jk ^a en lámina o en tubo.
BS-75	30104316	Suero anti Jk ^b	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Jk ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Jk ^b en lámina o en tubo.
BS-76	30106010	Suero anti k (Cellano)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti k (Cellano), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo k (Cellano) en lámina o en tubo.
BS-77	30104318	Suero anti K (Kell)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti K (Kell), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo K (kell) en lámina o en tubo.
BS-78	30104320	Suero anti Kp ^a	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Kp ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Kp ^a en lámina o en tubo.
BS-79	30104321	Suero anti Kp ^b	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Kp ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Kp ^b en lámina o en tubo.



000072