| BS-80 | 30104322 | Suero anti Le^a (Lewis a)    | СМЗ | Centro de<br>Hemoterapia<br>II | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Le^a (Lewis a), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.  CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales.  USO: Determinación del Fenotipo Le^a (Lewis a) en lámina o en tubo.       |
|-------|----------|------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| BS-81 | 30104323 | Suero anti Le^b (Lewis b)    | СМЗ | Centro de<br>Hemoterapia<br>II | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Le^b (Lewis b), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.  CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales.  USO: Determinación del Fenotipo Le^b (Lewis b) en lámina o en tubo.       |
| BS-82 | 30103785 | Suero anti Lu^a (Lutheran a) | CM3 | Centro de<br>Hemoterapia       | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Lu^a (Lutheran a), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.  CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales.  USO: Determinación del Fenotipo Lu^a (Lutheran a) en lámina o en tubo. |
| BS-83 | 30103786 | Suero anti Lu^b (Lutheran b) | СМЗ | Centro de<br>Hemoterapia       | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Lu^b (Lutheran b), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales. USO: Determinación del Fenotipo Lu^b (Lutheran b) en lámina o en tubo.   |
| BS-84 | 30103787 | Suero anti M monoclonal      | CM3 | Centro de<br>Hemoterapia<br>II | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti M, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales. USO: Determinación del Fenotipo M en lámina o en tubo.                                   |
| BS-85 | 30103788 | Suero anti N monoclonal      | СМЗ | Centro de<br>Hemoterapia<br>II | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti N, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado.<br>Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales.<br>USO: Determinación del Fenotipo N en lámina o en tubo.                          |
| BS-86 | 30103789 | Suero anti P1 monoclonal     | СМ3 | Centro de<br>Hemoterapia       | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti P1, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales. USO: Determinación del Fenotipo P1 en lámina o en tubo.                                 |
| BS-87 | 30103790 | Suero anti S (Mayúscula)     | СМЗ | Centro de<br>Hemoterapia       | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti S (mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó policionales. USO: Determinación del Fenotipo S (mayúscula) en lámina o en tubo.           |
| BS-88 | 30104329 | Suero anti s (Minúscula)     | CM3 | Centro de<br>Hemoterapia<br>II | PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti s (Minúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policionales. USO: Determinación del Fenotipo s (Minúscula) en lámina o en tubo.           |