

# Efectividad de la adherencia a un programa de salud renal en una red sanitaria de Perú

Lima - Peru  
 Red Sanitaria Rebagliati



DM2  
 HTA y/o  
 >55 años



Cohorte 2013-2017

2.2(±1.4DS) años de seguimiento



20354 pacientes

♂ 54,3%

🍰 72,9 (±12,6 DS)

## ADHERENCIA

Evaluación por equipo interdisciplinario

Estadio 1 y 2	01 control / año
Estadio 3a - 3b	02 controles / año
Estadio 4	03 controles / año

Grupo no adherido  
 15553(76.4%)




Grupo Adherido  
 4801 (23.6%)




## RESULTADOS

2224(10.9%) fallecieron en el seguimiento  
 347(1.7%) ingresaron a diálisis

PACIENTES DE BAJO RIESGO  
 Estadios 1,2,3a A1 y A2



PACIENTES DE ALTO RIESGO  
 Estadios 3a-A3, 3b,4



### Conclusión:

La estrategia de cuidado multidisciplinario con evaluaciones estandarizadas según estadio es efectiva en reducir el ingreso a terapia de reemplazo renal cuando se identifica al paciente en estadios tempranos y en reducir la mortalidad en estadios avanzados.

Bravo-Zúñiga J, Saldarriaga EM, Chávez-Gómez R, Gálvez-Inga J, Valdivia-Vega R, Villavicencio-Carranza M, et al. Efectividad de la adherencia a un programa de salud renal en una red sanitaria de Perú. Rev Saude Publica. 2020;54:xx.