

CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL EMBARAZO: SÍNTESIS RÁPIDA DE EVIDENCIA

El embarazo es una condición especial de riesgo ante el COVID-19, entre otros aspectos, debido al **mayor consumo de oxígeno, la disminución de la capacidad residual y la vulnerabilidad del sistema inmune** propios de esta etapa.

Síntesis rápida de la evidencia que describe los reportes de casos disponibles hasta el momento* relacionados con SARS-CoV-2 en el embarazo.

* 27/03/2020

RESULTADOS

50 casos de gestantes con SARS-CoV-2



Transmisión vertical

NO HAY CERTEZA DE TRANSMISIÓN VERTICAL

Muestras de placenta, sangre del cordón umbilical, líquido amniótico y leche materna.

→ **TODAS con SARS-CoV-2 NEGATIVO**

Solo 02 NEONATOS fueron SARS-CoV-2 **POSITIVO**

Antecedentes epidemiológicos

Mayoría → Contacto directo con un familiar SARS-CoV-2 (+)

Características

- ✓ Edades de las personas entre 22 y 40 años.
- ✓ Mayoritariamente en el 3er. trimestre del embarazo.
- ✓ Indicación del término del embarazo → Neumonía por SARS-CoV-2.

Término del embarazo

- ✓ > cesárea.
- ✓ Partos vaginales (03).
- ✓ Partos prematuros (16)

Complicaciones perinatales

- ✓ Sufrimiento fetal (11).
- ✓ Ruptura prematura de membrana (06).
- ✓ Hipertensión gestacional (1).
- ✓ Muerte neonatal (1).

Síntomas iniciales

- ✓ Fiebre (41 casos)
- ✓ Tos (17 casos)
- ✓ Mialgias (6 casos)
- ✓ Dolor de garganta (5 casos)
- ✓ Disnea (4 casos)
- ✓ Diarreas (2 casos)

RECOMENDACIONES



Manejo multidisciplinario de la madre y el niño.



Tamizaje de síntomas o factores de riesgo al momento de la admisión de todas las embarazadas.



Neonatos de madres con infección confirmada deben ser aislados y se debe monitorizar los síntomas continuamente.



En casos sospechosos o probables, separar a la embarazada en un ambiente especial.



Durante el trabajo de parto de casos confirmados, hacer uso de salas con presión negativa y con estrictas medidas de bioseguridad (de ser posible).



El monitoreo de síntomas debe extenderse a los profesionales sanitarios que atiendan a los casos sospechosos y confirmados.

Fuente: CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL EMBARAZO: SÍNTESIS RÁPIDA DE EVIDENCIA 05-2020. Lima: ESSALUD; 2020.
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/direcc_invest_salud/RRI_05_2020_V3.pdf