

MEMORANDO CIRCULAR N° 21 -IETSI-ESSALUD-2022

**PARA:** Señores  
**GERENTES Y DIRECTORES**  
**CENTROS E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS**  
**REDES ASISTENCIALES Y REDES PRESTACIONALES**

**DE:** **CRISTIAN DIAZ VELEZ**  
Director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (e)

**ASUNTO:** Ampliación de vigencia de Dictámenes Preliminares de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – IETSI.

**REFERENCIA:** Informe N° 14-SDEPFYOTS-DETS-IETSI-ESSALUD-2022.

**FECHA:** Lima, 17 FEB 2022



Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en relación al asunto, manifestarles que el IETSI ha decidido **AMPLIAR** la vigencia por un año adicional de los dictámenes preliminares aprobatorios y no aprobatorios considerando la fecha de publicación y ampliaciones previas<sup>1</sup> (ver Anexo N° 1).

Asimismo, cabe mencionar que, de requerirse una reconsideración de algún dictamen preliminar publicado, estas pueden ser realizadas por el área usuaria correspondiente sustentando la solicitud con evidencia científica de buena calidad, proveniente de ensayos clínicos de fase III o de un análisis actualizado que responda a la necesidad de los pacientes con la condición clínica a tratar.

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Atentamente,



CRISTIAN DIAZ VÉLEZ  
Director del Instituto de Evaluación  
de Tecnologías en Salud e Investigación  
IETSI - ESSALUD

CDV/erps/vvpa/ljgc  
NIT: 8301-22-18

<sup>1</sup> <https://ietsi.essalud.gob.pe/dictámenes-evaluacion-tecnologica/>

**Anexo N° 1: Lista de Dictámenes Preliminares que se amplía vigencia.**

| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico                                         | Problema de Salud                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 006-DETS-IETSI-2021           | Pazopanib                                                     | Pacientes adultos con carcinoma renal de células claras recurrente/metastásico con intolerancia a sunitinib como tratamiento de primera línea                                                                     |
| N° 005-DETS-IETSI-2021           | Amfotericina B liposomal                                      | Pacientes adultos con diagnóstico de histoplasmosis diseminada con evento adverso serio a amfotericina B deoxicolato                                                                                              |
| N° 19-DETS-IETSI-2020            | Fórmula nutricional libre de aminoácidos de cadena ramificada | Pacientes con la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce                                                                                                                                                 |
| N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Osimertinib (primera línea)                                   | Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico                                                                         |
| N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Lenvatinib                                                    | Pacientes adultos con cáncer de tiroides diferenciado, metastásico, refractario a yodo radioactivo                                                                                                                |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Somatropina (administrada con dispositivo electrónico)        | Pacientes pediátricos con déficit de hormona del crecimiento                                                                                                                                                      |
| N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Vacuna hexavalente                                            | Niños que presentan problemas neurológicos                                                                                                                                                                        |
| N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Ibrutinib                                                     | Tratamiento en primera línea o recaída de pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma de células pequeñas con delación 17p o mutación TP53                                                                 |
| N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Lanreotida autogel                                            | Tumor neuroendocrino primario gastrointestinal, estadio clínico IV, grado 2, sin tratamiento previo                                                                                                               |
| N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 | Óxido nítrico                                                 | Hipertensión pulmonar severa en neonatos mayores de 34 semanas de edad gestacional                                                                                                                                |
| N° 059-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Dolutegravir en combinación con abacavir más lamivudina       | Tratamiento de pacientes adultos con diagnóstico de VIH con contraindicación de efavirenz                                                                                                                         |
| N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Oligoelementos pediátricos endovenosos                        | Recién nacidos o lactantes que reciben nutrición parenteral                                                                                                                                                       |
| N° 057-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Pembrolizumab asociado a quimioterapia                        | Tratamiento de primera línea de pacientes adultos con adenocarcinoma de pulmón metastásico, con las mutaciones EGFR y ALK negativas                                                                               |
| N° 056-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Acetato de abiraterona                                        | Cáncer de próstata metastásico visceral resistente a la castración con progresión a quimioterapia previa                                                                                                          |
| N° 056-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Enzalutamida                                                  | Cáncer de próstata metastásico visceral resistente a la castración con progresión a quimioterapia previa                                                                                                          |
| N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Afatinib primera línea                                        | Cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado (estadios IIIB/IV), con mutaciones activadoras del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, con contraindicación a erlotinib por hipersensibilidad |





|                                  |                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Ibrutinib                                                | Enfermedad de injerto contra huésped crónica post-trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos refractaria a corticoide                  |
| N° 011-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Ácido 5-aminolevulínico                                  | Procedimiento de resección quirúrgica en pacientes adultos con sospecha de glioma de alto grado                                                  |
| N° 009-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Alectinib primera línea                                  | Cáncer metastásico de pulmón de células no pequeñas ALK (+)                                                                                      |
| N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Lanreotida                                               | Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo                                 |
| N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Olaparib                                                 | Terapia de mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial de alto grado, platino sensible y con mutación BRCA                 |
| N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Sugammadex                                               | Distrofia miotónica sometidos a cirugía bajo anestesia general                                                                                   |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Ceftolozano/tazobactam                                   | Adultos con enfermedad renal crónica e infección del tracto urinario por pseudomonas XDR con sensibilidad demostrada a ceftolozano/tazobactam    |
| N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Bevacizumab más quimioterapia                            | Tratamiento de primera línea en pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial EC IIIB y IIIC, operadas                                 |
| N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Daratumumab en combinación con bortezomib y dexametasona | Mieloma múltiple en recaída/refractario que ha tenido al menos una línea de tratamiento previo para el relapso/refractariedad                    |
| N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Vedolizumab                                              | Pacientes adultos con colitis ulcerativa activa moderada a severa refractaria a Infliximab                                                       |
| N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Fórmula nutricional libre de fenilalanina y tirosina     | Pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tirosinemia tipo I                                                                               |
| N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Sugammadex                                               | Pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bajo anestesia general                                                                        |
| N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Bosentan                                                 | Hipertensión arterial pulmonar con fracaso o intolerancia a la terapia con sildenafil                                                            |
| N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Dexmedetomidina                                          | Sedación leve a moderada de adultos con ventilación mecánica invasiva en unidades de cuidados intensivos                                         |
| N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Nivolumab                                                | Melanoma maligno de alto riesgo (estadio clínico III B, IIIC y IV) resecado                                                                      |
| N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Eltrombopag                                              | Pacientes pediátricos con púrpura trombocitopénica inmune crónica, refractario, resistente o intolerante a dos líneas de tratamiento             |
| N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Eculizumab                                               | Hemoglobinuria paroxística nocturna y hemólisis que requieren transfusiones, no candidato a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos |
| N° 048-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Factor VIII                                              | Seguridad del concentrado de factor VIII derivado de plasma de alta pureza en pacientes con diagnóstico de hemofilia A                           |



|                                  |                                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 047-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Palbociclib más fulvestrant          | Cáncer de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativo y progresión metastásica durante terapia hormona                                                  |
| N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Sunitinib                            | tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico, no resecable, y tratado con al menos dos líneas de tratamiento (octreotide y quimioterapia)        |
| N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Denosumab                            | Osteoporosis postmenopáusica con contraindicación para uso de bifosfonatos por enfermedad renal crónica avanzada (estadio 4 o 5)                                    |
| N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Cetuximab                            | Cáncer de cabeza y cuello recurrente metastásico e irresecable, sin tratamiento sistémico previo en enfermedad metastásica                                          |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Abatacept                            | Artritis reumatoide activa, moderada a severa con falla a anti-TNF y anti-CD20                                                                                      |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Tofacitinib                          | Artritis reumatoide activa, moderada a severa con falla a anti-TNF y anti-CD20                                                                                      |
| N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Crizotinib                           | Cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo en pacientes no tributarios de quimioterapia y sin tratamiento sistémico previo                               |
| N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Adalimumab                           | Uveítis activa no infecciosa, con respuesta inadecuada a corticoides e inmunomoduladores                                                                            |
| N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Colestiramina                        | Pacientes pediátricos con prurito severo secundario a colestasis crónica y refractarios a antihistamínicos, estimulantes de enzimas hepáticas, y tratamiento tópico |
| N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Elosulfasa alfa                      | Pacientes con diagnóstico de mucopolisacaridosis IV A                                                                                                               |
| N° 062-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Diazóxido                            | Hipoglicemia hiperinsulinémica persistente congénita                                                                                                                |
| N° 061-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Mifamurtida                          | Osteosarcoma osteoblástico no metastásico sin tratamiento sistémico previo, en el contexto de adyuvancia con quimioterapia MAPI                                     |
| N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ustekinumab                          | Psoriasis moderada-severa en pacientes con falla terapéutica a infliximab                                                                                           |
| N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Cinacalcet                           | Hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica de estadio V en terapia sustitutiva renal                                                                 |
| N° 016-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | L-asparaginasa Erwinia               | Leucemia linfoblástica aguda con hipersensibilidad previa a L-asparaginasa E. Coli nativa                                                                           |
| N° 016-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | L-asparaginasa E.Coli pegilada       | Pacientes con leucemia linfoblástica aguda con hipersensibilidad previa a L-asparaginasa E. Coli nativa                                                             |
| N° 015-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Fórmula en base a aminoácidos libres | Pacientes pediátricos con gastroenteropatías eosinofílicas                                                                                                          |
| N° 013-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Cladribina                           | Tricoleucemia                                                                                                                                                       |
| N° 012-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Vemurafenib                          | Melanoma maligno avanzado con mutación del BRAF/V600E con progresión al uso de nivolumab                                                                            |





|                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 010-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Posaconazol                                                                   | Profilaxis antifúngica en pacientes neutropénicos severos por quimioterapia de inducción o trasplante alogénico de médula ósea, con neoplasia hematológica con alto riesgo de infección fúngica invasiva |
| N° 009-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Formulaciones lipídicas de amfotericina B (primera línea)                     | Mucormicosis                                                                                                                                                                                             |
| N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Golimumab                                                                     | Colitis ulcerativa moderada a severa, refractaria a tratamiento convencional y biológico con infliximab                                                                                                  |
| N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | coenzima Q10, carnitina y riboflavina                                         | Enfermedades mitocondriales                                                                                                                                                                              |
| N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Tofacitinib                                                                   | Artritis reumatoide refractaria a anti-TNF y anti-CD20                                                                                                                                                   |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Panitumumab combinación FOLFOX O FOLFIRI                                      | Cáncer colorrectal metastásico con gen KRAS no mutado (Wild type) e irresecable                                                                                                                          |
| N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Everolimus                                                                    | Cáncer renal metastásico de células claras con progresión a tratamiento de primera línea con inhibidores de la tirosina quinasa                                                                          |
| N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Brentuximab Vedotin                                                           | Linfoma anaplásico de células T ALK negativo con progresión de enfermedad a más de dos líneas de quimioterapia previa                                                                                    |
| N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Bevacizumab combinación FOLFIRI (segunda línea)                               | Cáncer colorrectal metastásico                                                                                                                                                                           |
| N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ibrutinib                                                                     | Linfoma de células del manto con al menos dos líneas de tratamiento previo                                                                                                                               |
| N° 081-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Pertuzumab + (trastuzumab+ docetaxel)                                         | Cáncer de mama metastásico HER2 positivo sin terapia sistémica previa                                                                                                                                    |
| N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Pazopanib (primera línea)                                                     | Carcinoma renal de células claras metastásico sin tratamiento previo, ECOG 0-1 y factor de riesgo intermedio o bajo MSKCC                                                                                |
| N° 021-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Flúor 18 Fluorodexosiglucosa (F18-FDG) en tomografía de emisión de positrones | Epilepsia refractaria posibles candidatos a cirugía                                                                                                                                                      |
| N° 020-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Ataluren                                                                      | Distrofia muscular de Duchenne portadores de una mutación sin sentido en el gen de distrofina                                                                                                            |
| N° 019-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Crizotinib (primera línea)                                                    | Cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico positivo al gen de fusión ALK                                                                                                                        |
| N° 016-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula a base de aminoácidos esenciales                                      | Defecto del ciclo de la urea                                                                                                                                                                             |
| N° 015-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Bortezomib en combinación con lenalidomida y dexametasona                     | Leucemia de células plasmáticas primaria                                                                                                                                                                 |
| N° 013-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Lapatinib (segunda línea)                                                     | Cáncer de mama HER2 positivo con metástasis cerebral, refractario a tratamiento de primera línea con esquemas de quimioterapia asociados a trastuzumab                                                   |



|                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 012-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Vildagliptina                                         | Diabetes Mellitus tipo 2, riesgo de hipoglicemia, limitantes para uso de insulina, sin control metabólico adecuado a pesar de tratamiento con metformina y glibenclamida                |
| N° 010-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Eltrombopag<br>(segunda línea)                        | Púrpura trombocitopénica inmune primaria que ha fracasado a la primera línea de tratamiento                                                                                             |
| N° 009-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Metreleptina<br>(Primera línea)                       | Lipodisforia Generalizada Congénita                                                                                                                                                     |
| N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Linezolid                                             | Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR)                                                                                                                                         |
| N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Pertuzumab<br>(neoadyuvancia)                         | Cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado, sin tratamiento previo                                                                                                                |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Formulaciones lipídicas<br>(Amfotericina B liposomal) | Criptococosis meníngea, y hayan presentado eventos adversos serios al uso de Amfotericina B Deoxicolato                                                                                 |
| N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Sorafenib                                             | Hepatocarcinoma con enfermedad inoperable o metastásica                                                                                                                                 |
| N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Factor VII recombinante<br>activado                   | Hemofilia A severa, títulos de inhibidores de alta respuesta, alto riesgo de evento agudo de sangrado y sin respuesta a tratamiento con concentrado de complejo protrombínico activado) |
| N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Clofarabina+Ciclofosfá<br>mida+ Etopósido             | Leucemia linfocítica aguda recurrente y/o refractaria a dos líneas de tratamiento                                                                                                       |

