



COMUNICADO DE SEGURIDAD DE FARMACOVIGILANCIA N° 004-2020

Riesgo de **reacciones psiquiátricas** asociadas a **timolol**

Timolol es un fármaco bloqueante de los receptores beta-adrenérgicos indicado; tópicamente, para la hipertensión ocular, glaucoma crónico de ángulo abierto incluidos pacientes afáquicos y en algunos casos pacientes con glaucoma secundario. EsSalud cuenta con timolol (como maleato) de 0.5% x 5mL en la presentación farmacéutica de colirio o gotas oftálmicas^{1,2}.

Recientemente, la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido (MHRA) ha informado sobre el posible riesgo de **reacciones psiquiátricas asociadas al uso de timolol**; tales como: **depresión, pesadillas, insomnio, pérdida de memoria y alucinaciones**, con frecuencia de aparición no definida².

En ese sentido, el **Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de EsSalud (CRI – EsSalud)** recomienda a los profesionales de la salud tomar en cuenta lo siguiente:

- ✓ Vigilar los síntomas de trastornos psiquiátricos en pacientes que usen timolol.
- ✓ En pacientes con enfermedades psiquiátricas subyacentes, evaluar el beneficio-riesgo del uso de timolol para evitar posibles exacerbaciones de los trastornos psiquiátricos.
- ✓ Instruir al paciente que en caso identifique alguna señal de trastorno psiquiátrico, debe comunicarlo inmediatamente a su médico tratante.

Finalmente, se recuerda a los profesionales sanitarios, que es necesario y obligatorio reportar al CRI – EsSalud las sospechas de reacciones adversas que se identifiquen por el uso de productos farmacéuticos que se utilizan en la institución.

Lima, 03 de febrero del 2020

1. CIMA. AEMPS. Ficha Técnica Cusimolol (Timolol) 5mg/mL. Consultado 24 de enero 2020. Disponible: https://cima.aemps.es/cima/dohtml/ft/55808/FT_55808.html#4-8-reacciones-adversas

2. EMC. Reino Unido. Timoptol (Timolol) 0.25% w/v y 0.50% w/v. Consultado 24 de enero 2020. Disponible: <https://www.medicines.org.uk/emc/product/5110/smpc>