



COMUNICADO DE SEGURIDAD DE FARMACOVIGILANCIA N° 005-2020

## Interacciones medicamentosas de clopidogrel con agonistas opioides

**Clopidogrel** es un profármaco, cuyo metabolito es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Está indicado en la prevención secundaria de acontecimientos aterotrombóticos y tromboembólicos incluyendo accidente cerebrovascular en pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio, infarto cerebral o que padecen enfermedad arterial periférica establecida, así como aquellos pacientes que presentan un síndrome coronario agudo. EsSalud cuenta con clopidogrel de 75 mg en la presentación farmacéutica de tableta para administración vía oral<sup>1</sup>.

Recientemente, la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido (MHRA) ha informado sobre la **interacción medicamentosa de clopidogrel con agonistas opioides**; tales como: tramadol, codeína, oxicodona, entre otros<sup>2,3</sup>.

Interacción	Mecanismo	Consecuencia
Clopidogrel + Opioides	Los opioides pueden retrasar y reducir la absorción de clopidogrel administrado vía oral al enlentecer el vaciado gástrico <sup>2,3</sup> .	<b>Reducción del efecto antiplaquetario del clopidogrel<sup>3</sup>.</b>

En ese sentido, el **Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de EsSalud (CRI – EsSalud)** recomienda lo siguiente:

- ✓ Monitorear la efectividad clínica del clopidogrel en pacientes que reciban concomitantemente medicamentos opioides.
- ✓ En pacientes con síndrome coronario agudo que requieren un agonista opioide, se debe considerar el uso de un agente antiplaquetario parenteral<sup>2,3</sup>.

Finalmente, se recuerda a los profesionales sanitarios, que es necesario y obligatorio reportar al CRI – EsSalud las sospechas de reacciones adversas que se identifiquen durante el uso de productos farmacéuticos.

Lima, 03 de febrero del 2020

1. CIMA. AEMPS. Ficha Técnica Clopidogrel 75 mg. Consultado: 27 de enero 2020. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/71622/FT\\_71622.html#4-1-indicaciones-terap](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/71622/FT_71622.html#4-1-indicaciones-terap)
2. EMC. Reino Unido. Plavix (clopidogrel) 75 mg. Consultado: 27 de enero 2020. Disponible: <https://www.medicines.org.uk/emc/product/5935/smpcucas>
3. MICROMEDEX. Interacción de fármacos: clopidogrel + opioides (tramadol, codeína, oxicodona, fentanilo, morfina, metadona, buprenorfina). Consultado: 27 de enero 2020. Disponible: <https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidenceexpert.ShowDrugInteractionsResults>