

COMUNICADO DE SEGURIDAD DE FARMACOVIGILANCIA N° 013-2019



ANTIDEPRESIVOS: PRECAUCIONES EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL



Los **antidepresivos** asociados a la disfunción sexual son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) fluoxetina y sertralina, así como, los inhibidores noradrenérgico y serotoninérgico, venlafaxina y mirtazapina, respectivamente.¹

La **disfunción sexual**, es una reacción adversa frecuente y persistente, que se puede presentar en cualquier etapa del acto sexual (deseo, excitación, orgasmo, resolución) y que, además, afecta tanto a varones y mujeres.² La actual evidencia sugiere que, al suspender el medicamento sospechoso, en algunos casos no se llega a recuperar la totalidad de la función sexual.³

En ese sentido, el Centro de Referencia de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CRI-EsSalud) del IETSI, recomienda a los prescriptores lo siguiente:



Finalmente, se recuerda a los profesionales sanitarios, que es necesario implementar actividades de Farmacovigilancia, para fortalecer la información sobre la seguridad de productos farmacéuticos en el contexto peruano, por lo que, es **necesario y obligatorio** notificar los casos detectados al Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Para mayor información, contáctese al correo y anexo abajo señalados.

Lima, 09 de mayo del 2019.

farmacovigilancia@essalud.gob.pe
(51-01) 265-6000 / 265-7000
Anexo: 1953

1. Healy D, Le Noury J, Mangin D. Enduring sexual dysfunction after treatment with antidepressants, 5 α -reductase inhibitors and isotretinoin: 300 cases. Int J Risk Saf Med. 2018; 29(3-4):125-134.
2. Faraldo MIR, Fernández J, Paz J. Disfunción sexual asociada a tratamiento antidepresivo. Cadernos de atención primaria. 2011; 18:101-106.
3. Healy D. Citizen petition: Sexual side effects of SSRIs and SNRIs. Int J Risk Saf Med. 2018;29(3-4):135-147.