



Comunicado de seguridad de Farmacovigilancia N. 19-2020

Precauciones en el uso de **codeína** en **pacientes menores de 18 años**

Codeína es un analgésico de acción central, el cual ejerce su acción a través de los receptores opioides μ (aunque tiene una baja afinidad). El efecto analgésico se debe a su conversión en morfina. Este producto farmacéutico está indicado para el manejo de dolor de intensidad leve o moderada, además, para el tratamiento sintomático de la tos improductiva (1).

Recientemente, la **Agencia de Medicamentos de Canadá** recomendó la **limitación del uso de codeína en pacientes menores de 18 años** porque **puede contribuir en el desarrollo del uso inapropiado y dependiente de codeína y derivados opioides** (2).

En ese sentido, el **Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de EsSalud (CRI - EsSalud)**, recomienda a los profesionales de la salud de la institución lo siguiente:

- Buscar alternativas de tratamiento para pacientes menores de 18 años evaluado riesgo – beneficio.
- Indicar a los pacientes mayores de edad, que en caso tengan y/o usen medicamentos con codeína y derivados en casa, éstos deben almacenarlos fuera del alcance de menores.
- Sensibilizar a los pacientes sobre el riesgo dependencia de codeína y sus derivados

Finalmente, se recuerda a los profesionales prescriptores y demás profesionales de salud que, de identificarse alguna sospecha de reacción adversa a codeína, éste debe notificarse en el **Anexo N°04 “Formato de Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos”** o a través del link (<https://n9.cl/db73>). Cualquier consulta no dude en comunicarse con el IETSI a través del **CRI - EsSalud** o con el Comité de Farmacovigilancia de su centro asistencial.

Lima, 24 de agosto del 2020

1. CIMA-AEMPS. Ficha Técnica Codeína. Datos Clínicos: Reacciones Adversas. Consultado: 24 de agosto 2020. Disponible: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/5255/FT_5255.html
2. Healthy Canadá. Non-prescription pain relief products containing codeine are not recommended for use in people under 18 years of age. Consultado: 21 de agosto 2020. Disponible: <https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73635a-eng.php>